

Rzepak – (data aktualizacji 22-05-2007)

Zwalczanie chowaczy łodygowych i słodyszka rzepakowego

Zalecenia: przebieg pogody sprzyja wzrostowi gradacji chowaczy łodygowych i słodyszka rzepakowego, kapustnika.

W regionie Polski południowo-wschodnim, lubelskim

- trwa optymalny termin zwalczania chowaczy łodygowych i słodyszka rzepakowego

Zalecamy zabieg preparatem **Mospilan** w dawce **0,125kg/ha** -najdłużej działającym insektycydem lub **Mavrik 240 EW** w dawce **0,2l/ha**. oraz **Cyperkil** w dawce **0,1 l./ha**. lub **Karate Zeon** w dawce **0,1 l./ha**.

Zabieg wykonywać w godzinach przedpołudniowych i pełnego nasłonecznienia tj. w okresie zwiększonej migracji szkodników.

Zalecana ochrona:

II preparatem np. Karate Zeon, Cyperkil, Mavrik 240 EW

III zabieg powtórzyć Mospilanem w dawce 0,125 kg/ha na początku maja (5-10)

Choroby:

Trwa okres końca kwitnienia rzepaku ozimego.

W regionie **Polski południowo-wschodniej** -występuje nasilenie wysokie **suchej zgnilizny kapustnych – zabieg zalecany** oraz bardzo wysokie – **czern krzyżowych – zabieg konieczny!**, **cyndrosperioza – zabieg zalecany**

Należy wykonać jeden z zabiegów zabieg np.

- **Alert 0,8 l/ha,**
- **Alert 0,5 l/ha + Riza 0,5 l/ha,**
- **Escudo Forte w dawce 0,8l/ha**
- **Riza 1l/ha**

Chowacz Brukwiaczek



Chowacz Czterozębny



Słodyszek Rzepakowy



Zabieg wykonywać w godzinach przed i popołudniowych w okresie zwiększonej migracji szkodników.

Aktualna faza wzrostu rzepaku ozimego – 69 (koniec kwitnienia)

Chowacz brukwiaczek – powyżej 5 szt. – zabieg niekonieczny!

fast-chem

Kompleksowa Obsługa Rolnictwa

22-530 MIRCZE

ul. Kryłowska 10

TEL. +48 84 651 92 16

FAX. +48 84 651 03 09

biuro@fast-chem.pl

NIP: 919-000-01-65

Chowacz podobnik – powyżej 11 szt. – zabieg konieczny !!!

Słodyszek rzepakowy – powyżej 14 szt. na roślinie – zabieg zalecany !

Pryszczarek kapustnik - powyżej 6 szt. – zabieg konieczny !!!!



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2008

www.fast-chem.pl